

Carbolevure Enfant, gélule **charbon et levure**

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION : CARBOLEVURE ENFANT, gélule

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Les substances actives sont : Levure déshydratée vivante contenant au minimum, 10⁹ cellules de *Saccharomyces cerevisiae* par gramme (47.7 mg), Charbon activé (48 mg). Pour une gélule

Les autres composants sont : Polyvidone K 30, silice colloïdale, gélatine, oxyde de fer noir, dioxyde de titane, érythrosine, oxyde de fer rouge.

FORME PHARMACEUTIQUE : Gélule. Boîte de 20.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ADSORBANT INTESTINAL/FLORE DE SUBSTITUTION

(A : appareil digestif et métabolisme)

TITULAIRE/EXPLOITANT : PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne - France

FABRICANT : PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

45 place Abel-Gance - 92100 Boulogne - France

2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 ans :

- en cas de digestion difficile, notamment avec ballonnement intestinal,
- en complément de la réhydratation et/ou de mesures diététiques, dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée.

3. ATTENTION !

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de diarrhée, vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

- en l'absence d'amélioration au bout de deux jours de traitement,
- en cas d'apparition de fièvre, de vomissements,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation, c'est-à-dire une perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

La prise de comprimé et de gélule est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En cas de ballonnements, flatulences, éviter les légumes secs (lentilles, flageolets, pois...) ainsi que certains légumes verts (choux, chou de Bruxelles, bettes...). En cas de diarrhée, il est nécessaire de :

- se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres).

- s'alimenter le temps de la diarrhée,

- en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés.

- en privilégiant les viandes grillées, le riz.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A CONSULTER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

PRISE OU UTILISATION D'AUTRES MEDICAMENTS

Ce médicament pouvant diminuer l'absorption d'autres médicaments, ceux-ci doivent être administrés à distance de lui (plus de 2 heures, si possible). **VEUILLEZ INDIQUER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RECENTMENT UN AUTRE MEDICAMENT, MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.**

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Réservé à l'enfant de plus de 6 ans. Voie orale.

1 à 3 gélules par jour. Avaler la gélule telle quelle avec un verre d'eau.

FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE :

Les gélules doivent être avalées sans les ouvrir avec un peu d'eau, de préférence en dehors des repas.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS notamment, une coloration foncée des selles peut apparaître.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION :

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE :

Octobre 2010
Information médicale n° 0800 95 05 64.



Pierre Fabre



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament calistent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

Carbolevure For Children, capsule charcoal and yeast

1. DRUG IDENTIFICATION

NAME : CARBOLEVURE FOR CHILDREN, capsule

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

The active substances are : Live dehydrated yeast containing at least 10⁸ Saccharomyces cerevisiae cells per gram (47.7 mg), Activated charcoal (48 mg). For a capsule.

The other components are : Polyvidone K-30, colloidal silica, gélatin, black iron oxide, titanium dioxide, erythrosine, red iron oxide .

PHARMACEUTICAL FORM : Capsule. Box of 20.

PHARMACOTHERAPEUTIC GROUP

INTESTINAL ADSORBENT/SUBSTITUTE FLORA

(A: digestive system and metabolism)

HOLDER/OWNER : PIERRE FABRE MEDICAMENT

45 place Abel-Gance - 92100 Boulogne - France

MANUFACTURER : PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

45 place Abel-Gance - 92100 Boulogne - France

2. THERAPEUTIC INDICATIONS

This medicine is indicated for children over 6 years of age:

- suffering from difficult digestion, particularly with intestinal bloating,
- symptomatic treatment of diarrhea in addition to rehydration and/or dietary measures.

3. IMPORTANT!

WHEN SHOULD THIS MEDICINE NOT BE USED

This medicine must not be used by those with a known allergy to one of its components.

IF IN DOUBT, IT IS ESSENTIAL THAT YOU SEEK THE ADVICE OF YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

SPECIAL WARNINGS

In the event of diarrhea, consult your doctor rapidly if you experience any of the following:

- No improvement after two days of treatment
- A high temperature or vomiting.
- The passage of blood or mucus in stools.
- Intense thirst or a dry tongue. These are the first signs of dehydration, in other words serious fluid loss as a result of diarrhea. Your doctor will decide whether it is necessary to prescribe oral or intravenous rehydration treatment.

The taking of capsules by children under 6 years of age is contraindicated as there is a risk of it going down the wrong way, and therefore suffocation.

PRECAUTIONS FOR USE

Should you experience bloating or flatulence, avoid eating pulses (lentils, flageolet beans, peas, etc.) and certain green vegetables (cabbage, Brussels sprouts, chard, etc.).

In the event of diarrhea, you should:

- rehydrate yourself by drinking abundant amounts of water containing salt or sugar to compensate for fluid lost as a result of diarrhea (the average daily water ration for adults is 2 liters)

• be careful about what you eat until the diarrhea stops

- by excluding certain foods - particularly raw vegetables, fruit, green vegetables and spicy food - and very cold food or drinks
- by opting for grilled meat and rice

IF IN DOUBT, DO NOT HESITATE TO CONSULT YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

INTERACTION WITH OTHER MEDICINAL PRODUCTS AND OTHER FORMS OF INTERACTION

This medicine can inhibit the absorption of other medicines, and should therefore be taken alone (if possible, respecting an interval of at least two hours).

IN ORDER TO AVOID POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN SEVERAL MEDICINAL PRODUCTS, ANY OTHER ONGOING TREATMENT SHOULD BE SYSTEMATICALLY REPORTED TO YOUR DOCTOR OR TO YOUR PHARMACIST.

PREGNANCY - BREAST-FEEDING

It is not recommended to use this medicine during pregnancy.

If you find out that you are pregnant during treatment, only your doctor can judge the necessity of continuing.

As a general rule, during pregnancy and breast-feeding, it is recommended to always ask your doctor or pharmacist for advice before taking a medicinal product.

4. HOW SHOULD THIS MEDICINE BE USED?

POSODOLOGY

For use only by children over 6 years of age. Oral use. 1 to 3 capsules per day. Swallow the capsule with a glass of water.

FREQUENCY AND MOMENT AT WHICH THE MEDICINE SHOULD BE ADMINISTERED

The capsules should be swallowed unopened with a little water, preferably between meals.

5. UNDESIRABLE EFFECTS

THIS MEDICINE MAY TRIGGER VARYING DEGREES OF UNDESIRABLE EFFECTS IN CERTAIN PEOPLE, notably the darkening of stools.

REPORT TO YOUR DOCTOR OR TO YOUR PHARMACIST ANY UNDESIRABLE EFFECTS THAT ARE NOT MENTIONED IN THIS LEAFLET.

6. STORAGE

Keep out of the reach and sight of children.

Store at temperature not exceeding 30°C.

DO NOT EXCEED THE BEST-BEFORE DATE SHOWN ON THE OUTER PACKAGING

7. DATE OF REVISION OF THE TEXT

October 2010.



Pierre Fabre