

Thuya

complexe n°37

Solution buvable en gouttes

COMPOSITION

Thuya occidentalis	4 DH,
Dulcamara	4 DH,
Mercurius corrosivus	3 DH,
Phytolacca decandra	4 DH,
Arsenicum iodatum	4 DH,
Pulsatilla	4 DH,
Phosphorus	8 DH,
Nitricum acidum	4 DH,
Kalium bichromicum	4 DH,

p.e.q.s.p. 30 ml.

Teneur en éthanol : 45 % V/V.

Excipient à effet notoire : éthanol.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Médicament non soumis à prescription médicale.

Médicament autorisé

n° 17.603 b-21.591 - CIP 34009 **337 031 2 7**



LEHNING
LABORATOIRES

3 rue du Petit Marais
57640 Sainte-Barbe - France

Thuya

complexe n° 37

Solution buvable en gouttes

INDICATIONS

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement général des verrues.

POSOLOGIE

Adultes : 20 gouttes 3 fois par jour.

Enfant à partir de 2 ans : ¼ ou ½ dose selon l'âge.

A prendre dans un peu d'eau, de préférence en dehors des repas.

Voie orale.

Ce médicament contient de l'éthanol ; son utilisation est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.
Grossesse et allaitement : demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.



CIP : 3400933703127

LOT : C1906



Thuja

complexe n° 37

WARTS

◆ 30 ml bottle.
Oral drops,
solution

INDICATIONS

Homeopathic medicine traditionally used in general treatment of warts.

DOSAGE

Adults: 20 drops 3 times a day.

Children over 2 years of age: $\frac{1}{4}$ or $\frac{1}{2}$ dose, according to age.

Take in a small amount of water, preferably not with meals.

Oral use.

Excipient with known effect: ethanol.

This medicine contains ethanol; utilization is harmful for those suffering from alcoholism. To be taken into account in pregnant or breast-feeding women, children and high-risk groups such as patients with liver disease or epilepsy. Pregnancy and breast-feeding: ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

**KEEP OUT OF THE REACH
AND SIGHT OF CHILDREN.**

Store below 25°C.