

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop ?
3. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop ?
6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

ENZYMES À VISÉE ANTI-INFLAMMATOIRE.

Ce médicament est indiqué dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U.CEIP/ml, sirop ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop**

- en cas d'antécédents d'allergie à l'alpha-amylase ou à l'un des composants du sirop, notamment les parabens.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

**Faites attention avec MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop**

**Mises en garde spéciales**

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E219) et du parahydroxybenzoate de propyle sodé (E217) et peut provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

**Précautions d'emploi**

En cas de survenue de fièvre et/ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments...) **CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.**

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

Ce médicament contient 3,2 g de saccharose par cuillère à café (5 ml) et 9,6 g de saccharose par cuillère à soupe (15 ml) ; en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

### Grossesse et allaitement

#### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

#### Allaitement

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Liste des excipients à effet notable** : jaune orangé S (E110), saccharose, parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E219), parahydroxybenzoate de propyle sodé (E217).

### 3. COMMENT UTILISER MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop ?

#### Posologie

**Adulte** : 1 cuillère à soupe (15 ml), 3 fois par jour.

**Enfant de plus de 3 ans (plus de 15 kg)** : 2 cuillerées à café (10 ml), 3 fois par jour.

**Nourrisson et enfant de 6 mois à 3 ans (7 kg à 15 kg)** : 1 cuillère à café (5 ml), 3 fois par jour.

**CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :**

- IL NE PEUT PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS,
- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

#### Mode et voie d'administration

Voie orale.

#### Durée du traitement

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- En raison de la présence d'alpha-amylase, rares réactions d'allure allergique, généralement cutanées, en particulier urticaire et œdème de Quincke, possibilité de survenue d'une gêne respiratoire (bronchospasme).

Dans ces cas, arrêtez le traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25 °C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

**Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop ?**

**La substance active est :**

Alpha-amylase ..... 20 000 U. CEIP\*  
pour 100 ml de sirop.

\*Soit 14 286 U. Ph. Eur.

**Les autres composants sont :**

**Excipients** : solution de saccharose, parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E219), parahydroxybenzoate de propyle sodé (E217), acide citrique monohydraté, jaune orangé S (E110), glycérol, huile essentielle soluble de mandarine S 164, eau potable.

**Qu'est-ce que MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 200 U. CEIP/ml, sirop et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme d'un sirop. Boîte de 1 flacon de 125 ml ou 200 ml.

#### Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

Information Patient : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

#### Fabricant

Unither Liquid Manufacturing

31770 Colomiers - France

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Novembre 2010.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).