

Ophtaxia®

Solution tamponnée stérile, enrichie en ions
pour lavage oculaire

**Solution tamponnée
stérile, enrichie en ions pour lavage
oculaire et dépourvue de conservateur.
Boîte de 10 récipients unidoses de 10 ml.**

COMPOSITION : Chlorure de sodium : 64 mg, chlorure de potassium : 7,5 mg, chlorure de calcium dihydraté : 4,8 mg, chlorure de magnésium hexahydraté : 3 mg.
Excipients : (Acétate de sodium trihydraté, citrate de sodium dihydraté, acide chlorhydrique, eau purifiée) q.s.p. 10 ml.

INDICATION : Hygiène de l'œil et de ses annexes par irrigation ou bains oculaires.
PEUT ÊTRE UTILISÉ EN USAGE QUOTIDIEN CHEZ LES BÉBÉS, ENFANTS, ADULTES ET PORTEURS DE LENTILLES.

MODE D'ACTION : OPHTAXIA® est une solution équilibrée en électrolytes. Ces électrolytes : le potassium, sodium, calcium, et magnésium sont naturellement présents dans les larmes. Le potassium a une concentration élevée, car il joue, avec le sodium un rôle essentiel dans le maintien de l'osmolarité.

L'association acétate de sodium et citrate de sodium joue un rôle tampon.

Elle ajuste et stabilise la solution à un pH aux environs de 7 et à une osmolarité d'environ 305 mosm, valeurs similaires aux larmes, ce qui permet de garantir une bonne tolérance dans le temps vis à vis de la cornée et du film lacrymal même en cas d'altération de ces éléments. L'absence de conservateur renforce la sécurité d'emploi en éliminant toute cytotoxicité potentielle, toujours envisageable avec la présence de tels produits. Tous ces éléments respectent l'intégrité de l'épithélium cornéen.

CONDITIONS DE STOCKAGE : Ne pas placer au réfrigérateur. Ne pas congeler.



Laboratoire Chauvin
416, rue Samuel Morse
34000 MONTPELLIER
France

CE 0459
1999

STERILE A

MODE D'EMPLOI : Posologie : 1 à 6 lavages ou applications par jour, selon les besoins. Mode d'administration : Se laver soigneusement les mains avant utilisation. Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec le récipient unidosé.

Dans le cadre d'un traitement associé, ne pas instiller dans le même temps une goutte d'OPHTAXIA® et le(s) collyre(s) Utiliser OPHTAXIA®, solution pour lavage ophtalmique :

- soit à l'aide d'une compresse stérile,
- soit en lavage direct par jet,
- soit en bain oculaire à l'aide d'une œillère stérile à usage unique qu'il convient de jeter après chaque utilisation.

**CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS
SECONDAIRES :** Lorsqu'il est utilisé comme

recommandé, il n'y a pas de contre-indication ou effet secondaire connus.

CONSERVATION : Le récipient unidosé est à usage unique. Il doit être jeté après usage. Ne pas réutiliser un récipient unidosé déjà ouvert et/ou entamé. Ne pas utiliser après la date de péremption. Ne pas restériliser. En cas de ré-utilisation le laboratoire ne garantit pas la propreté et la stérilité du produit. Ne pas utiliser si endommagé. Le cas échéant, jeter l'œillère à usage unique après utilisation. Stérilisation par filtration.



3401077908966